

AVES OBSERVADAS EN LAS ISLAS PICTON, NUEVA, LENNOX Y NAVARINO ORIENTAL. (1)

ALVARO BARROS VALENZUELA

INTRODUCCION

En diversas oportunidades hemos visitado el área para atender profesionalmente a los habitantes de esas hermosas y lejanas islas del accidentado territorio nacional, tan poco conocidas por nuestros compatriotas en lo que se refiere a su rica vida ornitológica.

Aprovechando el último viaje, ocurrido en el mes de julio de 1971, ofrecimos a nuestro amigo Mateo Martinić B., colaborar con el Instituto de la Patagonia, entregando una lista de las aves observadas en las islas. Afortunadamente, en noviembre de 1968 y mayo de 1970, para informar a nuestro padre, el ornitólogo Rafael Barros, ya habíamos tomado algunas notas aprovechando las diversas alternativas de nuestro trabajo. Se sumaron así observaciones sobre setenta y seis especies, lo que constituye una primera aproximación que deberá ser completada. Creemos que fácilmente pueden reconocerse otras especies, lo que nos fue imposible hasta el momento por no contar con los medios necesarios ni el tiempo suficiente.

AREA RECONOCIDA

Para los efectos de esta información señalaremos como área estudiada la siguiente: en la región oriental de la isla Navarino, desde Puerto Eugenia y sus alrededores, incluyendo diversos islotes y roqueros, hasta el islote Snipe. La costa a lo largo de paso Picton hasta Puerto Toro y los bosques circundantes a este pueblo. Hacia el sur hasta Puerto Sonia. En isla Picton, desde Punta Ganado hasta Puerto Banner sobre el canal Beagle y desde esa misma Punta hasta el puerto Tres por el paso Picton, incluyendo los alrededores de Puerto Piedra, el poblado más numeroso de la isla con sus veintiséis habitantes, donde fueron efectuadas la mayoría de las observaciones en esta isla. En isla Nueva, los alrededores del pueblo llamado caleta Las Casas, de veintiún habitantes, al sur poniente de la isla y los potreros comprendidos entre el río de la Virgen y caleta Teca, y la laguna Pidén hacia el oriente de la caleta. Sobrevolamos también esta isla aprovechando de hacer algunas observaciones, la más importante de las cuales para el efecto de este

(1) Este trabajo es una colaboración especial del autor, arquitecto de la Corporación de la Reforma Agraria y observador ornitológico. (Nota de la Dirección).

trabajo, ocurrió entre Punta Orejas y caleta Carlos en el Canal de Beagle, hecha a no más de doscientos metros de altura. Por último, el reconocimiento de isla Lennox pudimos efectuarlo entre punta Descanso y caleta del Oro, siendo caleta Lennox y caleta Brito los lugares mejor observados por vivir allí los vecinos que constituían la finalidad de nuestra presencia. También incluimos en esta isla lo observado en los islotes Luft, Ormeño, Quetro, Raquel, etc. (Fig. 1).

AGRADECIMIENTOS

Debo agradecer en especial la deferencia de Mateo Martinić, quien con mucha bondad y confianza facilitó este trabajo. A Brent J. Markham, biólogo del Instituto de la Patagonia, sin cuya ayuda estas páginas adolecerían de errores mayores. En especial debo agradecer a mi amigo Felipe Alvarez, yámana, viviente en Uquika, quien tuvo la bondad de comunicarme los nombres indígenas de las aves. También a Eduardo Mansilla, de Puerto Eugenia. A mi amigo José Cheuquel y familia, vecino de Puerto Piedras, en Picton. A Gumerindo Aguilar, de caleta Brito, y Gustavo González, de caleta Lennox, en isla Lennox, y a Onofre Miranda, Abelardo Silva, señora e hijos de caleta Las Casas, en isla Nueva. Ellos y otros vecinos facilitaron mis observaciones y con el conocimiento que tienen de la zona por vivir y trabajar en ella, permitieron que fueran más completas.

ORDEN SPHENISCIFORMES FAMILIA SPHENISCIDAE

1.—Pingüino del Sur.

Spheniscus magellanicus (Förster).

Nombre yámana: Shusha.

Nombres locales: Burro, Pingüín.

En noviembre de 1968 fueron observados tres ejemplares nadando cerca de los islotes Eugenia sobre el canal Beagle.

En julio de 1971 se observó uno junto al islote Ormeño, en Lennox y otro a una milla al oriente del islote El Ganso, cerca de Puerto Toro. Asimismo, dos ejemplares sobre el canal Beagle al nororiente del islote Snipe.

Los vecinos lo reconocen fácilmente asegurando que anida junto al pingüino de penacho amarillo —*Eudyptes crestatus* (Miller)— en los islotes Evouts en grandes colonias.

ORDEN PODICIPEDIFORMES FAMILIA PODICIPEDIDAE

2.—Huala.

Podiceps major (Boddaert).

Nombre yámana: Tagash.

Nombre local: Huala.

En noviembre de 1968 se observaron parejas en los alrededores de Puerto Toro y Puerto Piedra en isla Picton. Con más frecuencia desde punta Yeshcaoa hasta caleta del Oro en isla Lennox.

Al oscurecer y en la noche se escuchaban sus lastimeros reclamos. En julio de 1971 en estos mismos sitios los ejemplares fueron vistos en forma solitaria, salvo en caleta Lennox, donde durante tres días vimos una pareja que buscaba su alimento entre los huiros al lado norte de la bahía.

3.—Blanquillo.

Podiceps occipitalis occipitalis Garnot.

Nombre yámana: Gashúc.

Nombre local: Coico, Pollollo.

En noviembre de 1968 un ejemplar solitario se observó en la bahía de Puerto Piedra (Picton). Por esos días vimos una pareja en la laguna San José de los Patos (Lennox) en su período nupcial.

4.—Pimpollo.

Podiceps rolland chilensis (Lesson).

Nombre yámana: Gashúc.

Nombre local: Coico, Pollollo.

Relativamente abundante. En caleta Lennox, en julio de 1971, fueron observados siete ejemplares en la cercanía de una pareja de hualas. Dos parejas en Puerto Piedra. Cinco parejas entre Puerto Toro y bahía Chelinaia. Todas las observaciones coincidieron en localizarlos en aguas bajas con roqueríos y huiros donde frecuentemente se zambullían buscando alimento.

ORDEN PROCELLARIIFORMES

FAMILIA DIOMEDEIDAE

5.—Albatros.

Diomedea exulans exulans Linné [*Diomedea epomophora* (Lesson)].

Nombre yámana: Cayelij.

Nombre local: Albatros.

Difícil es distinguir ambas especies sólo con la observación a la distancia. En el canal Beagle, entre Puerto Eugenia y Puerto Banner fueron contados setenta y tres ejemplares nadando después de las tres de la tarde del día 17 de mayo de 1970. Al mismo tiempo algunos evolucionaban para luego posarse sobre las aguas.

6.—Albatros de Ceja Negra.

Diomedea melanophrys (Temminck).

Nombre yámana: Garpu.

Nombre local: Albatros.

En noviembre de 1971 fueron observados cientos de ejemplares en un área comprendida tanto sobre el Beagle, paso Picton como bahía Oglander. En las horas en que los vientos fueron más violentos se observaron abundantemente, lo que hace pensar que en condiciones de mayor calma se alejaron hacia el sur donde el océano Pacífico es más abierto.

FAMILIA PUFFINIDAE

7.—Petrel Gigante.

Macronectes giganteus (Gmelin).

Nombre yámana: Tachulú.

Nombres locales: Carnero, Pájaro Carnero, Milimoque.

Fue observado constantemente durante la travesía en los tres viajes. Ejemplares siempre solitarios se acercaban confiadamente a las embarcaciones siguiendo durante algunos minutos el mismo rumbo. Esto ocurrió tanto en el canal Beagle como en todos los ámbitos de la bahía Oglander.

8.—Petrel Plateado.

Priocella antarctica (Stephens).

Nombre local: Petrel.

En la bahía Oglander a dos millas del cabo Santa María (sur isla Picton) se vieron tres ejemplares evolucionando cerca de gaviotas comunes y petreles gigantes. Entre los islotes Luft y Augustus, pudimos verlos constantemente muy cerca de la embarcación. Estas observaciones corresponden a julio de 1971.

9.—Petrel Moteado.

Daption capensis (Linné).

Nombre local: Tablero.

En mayo de 1970 en la travesía entre Lennox e isla Nueva vimos un ejemplar de esta hermosa ave evolucionando con gran soltura en medio de un temporal desatado. El 17 de julio de 1971 volvimos a observarlo cuatro veces en la bahía Oglander.

10.—Petrel Azulado.

Halobaena caerulea (Gmelin).

Nombre local: Petrel.

Un ejemplar fue observado el 17 de julio de 1971 a dos millas al sur del islote Montura (isla Picton), volando en proximidad de petreles plateados.

FAMILIA HYDROBATIDAE

11.—Golondrina de mar común.

Oceanites oceanicus chilensis (Murphy).

Nombre local: Golondrina de mar.

Un ejemplar cruzó cerca de la nave una milla y media al nororiente del islote Ormeño (Lennox) el 17 de julio de 1971.

FAMILIA PELECANOIDIDAE

12.—Pato Yunco de Magallanes.

Pelecanoides magellani (Mathews).

Nombre yámana: Lela.

Nombre local: Golondrina Zambullidora.

Este pequeño petrel frecuentemente fue observado en julio pasado (1971) en la bahía Oglander a lo menos desde una distancia de una milla de las costas de Picton, Nueva, Lennox y Navarino. Efectuaba su característico vuelo a ras de las olas para zambullirse tan inesperadamente como había emergido de la superficie del océano.

ORDEN CHARADRIIFORMES

FAMILIA STERCORARIIDAE

13.—Salteador Común.

Catharacta skua chilensis (Bonaparte).

Nombre yámana: Huiláhuila.

El 21 de noviembre de 1968 se vieron a menudo salteadores desde las rocas de Eugenia hasta el islote Snipe y por el Beagle hasta Banner en Picton, persiguiendo a gaviotines. Esto mismo observamos desde un avión dos días antes entre caleta Pescado y caleta Carlos, sobre el canal Beagle, en isla Nueva, volando a unos doscientos metros de altura.

FAMILIA LARIDAE

14.—Gaviota Dominicana

Larus dominicanus (Lichtenstein).

Nombre yámana: Quevacu.

Nombre local: Gaviota.

Abundante en toda el área. Observada en todos los viajes. En julio último se observaron ejemplares en plumaje inmaduro en un 40% de los casos. En caleta Lennox se observó una bandada de más de 50 individuos a la orilla de la playa.

15.—Gaviota Cágüil.

Larus maculipennis Lichtenstein.

Nombre yámana: Weimankipa.

Nombre local: Gaviota chica.

Menos ejemplares que la gaviota común en las observaciones hechas durante el invierno. El noviembre de 1968 era más abundante. Se las vio volando, ya nadando en grupos de tres a cinco ejemplares, fuera de múltiples ocasiones en las que ejemplares aislados revoloteaban en busca de alimento.

16.—Gaviota Austral.

Leucophaeus scoresbii (Traill).

Esta preciosa gaviota fue observada en toda el área con una frecuencia similar a la del Cágüil.

17.—Gaviotín Sudamericano.

Sterna hirundinacea Lesson.

Nombre local: Tijera.

En los islotes de Eugenia en el canal Beagle se observaron cientos de ejemplares que pernoctaban en algunos de ellos. Ejemplares aislados fueron observados en toda el área. Esto ocurrió en noviembre de 1968.

FAMILIA CHIONIDAE

18.—Paloma Antártica.

Chionis alba (Gmelin).

Nombre yámana: Olamana.

Nombre local: Paloma de Mar.

En mayo de 1970 y julio de 1971 fueron observados varios ejemplares. Los primeros en los islotes Eugenia y en las rocas de Puerto Piedra de Picton. Este año cuatro palomas fueron observadas largamente mientras volaban desde isla Lennox a Navarino. Se posaron en los roqueríos al sur del islote Ganso donde ya estaban posados otros siete ejemplares. Esto ocurrió el 20 de julio.

FAMILIA SCOLOPACIDAE

19.—Becasina.

En las vegas al nororiente de caleta Brito, isla Lennox, vimos volar ejemplares de becasina, pero no pudimos determinar si se trataba de *Gallinago paraguayae magellanicus* (King) o *Chubbia stricklandii* (Gray). Fueron observados en noviembre.

20.—Playeros.

Fueron observados en varias oportunidades durante todos los viajes. Por lo menos correspondían a dos especies. Al no tener los elementos necesarios para capturar y determinarlos, es imposible saber de qué especies se trataba. Aún con binoculares es fácil cometer errores por lo que sólo agregamos que algunos de ellos andaban solitarios o en parejas sobre las rocas.

FAMILIA CHARADRIIDAE

21.—Queltegüe Austral.

Belonopterus chilensis fretensis Brodkorb.

Nombre local: Queltegüe, Tero.

En las vegas al poniente de Puerto Eugenia y en algunos islotes bajos frente al puerto fueron observados ejemplares durante el mes de noviembre.

22.—Pollitos de Mar.

Nombre yámana: Lala.

Una bandada de alrededor de sesenta individuos fue observada en las playas de caleta Lennox. En otro sitio una bandada de 17. Imposible determinar su especie. Es probable que se hayan visto más de dos especies en las playas visitadas, pero vale en este caso lo dicho respecto a los playeros.

FAMILIA HAEMATOPODIDAE

23.—Pilpilén Austral.

Haematopus leucopodus (Garnot).

Nombre yámana: Ushhuilirc.

Nombre local: Filfil.

Fue observado en todos los viajes, ya solitarios ya en grupos de dos y más ejemplares, en las cuatro islas.

24.—Pilpilén Negro.

Haematopus ater (Vieillot y Oudart).

Nombre yámana: Swilish.

Nombre local: Huaso.

Igual que el anterior en todas las islas e islotes adyacentes fue observado siempre en parejas como ave residente.

ORDEN GRUIFORMES

FAMILIA RALLIDAE

25.—Pidén.

Ortygonax rytirhynchos luridus (Peale).

Nombres locales: Cotuta, Pidén.

Fue observado en mayo de 1970 en las vegas al norte y oriente de caleta Las Casas en isla Nueva. En los juncasles y junto al río se les escuchaba en las tardes. El riachuelo que desemboca en la bahía al norte de los galpones y corrales de esquila es llamado por los vecinos río Cotuta.

ORDEN ANSERIFORMES

FAMILIA ANATIDAE

26.—Caranca.

Chloëphaga hybrida (Molina).

Nombre yámana: Schacúsh.

Nombre local: Comeluche, Caranco.

Observado en toda el área en los tres viajes, siempre en parejas, salvo al oriente de Puerto Eugenia, donde dos machos estaban juntos a una sola hembra. Determinamos en algunas costas que había una pareja más o menos cada cuatrocientos metros (entre Puerto Toro y Puerto Eugenia).

Esta observación pudimos hacerla con cierta precisión en un vuelo en avioneta a poca altura entre punta Orejas y caleta Carlos sobre el canal Beagle en isla Nueva.

27.—Caiquén.

Chloëphaga picta (Gmelin).

Nombre yámana: Kimóa.

Nombre local: Caiquén.

Observado en la zona de Eugenia, Puerto Toro, isla Picton e isla Nueva en el mes de noviembre de 1968 en bandadas de hasta 30 ejemplares.

28.—Avutarda Colorada.

Chloëphaga rubidiceps Sclater.

Nombre yámana: Lurúj.

Nombre local: Avutarda.

Observada en mucho menor número en Puerto Eugenia e isla Picton, en los potreros al suroriente de los corrales de Puerto Piedra.

29.—Pato Juarjual.

Lophonetta specularioides specularioides (King).

Nombre yámana: Huilín.

Nombre local: Pato.

Se encontraba en parejas o solitarios en las lagunillas, o en las orillas de costa en todas las islas visitadas en los tres viajes.

30.—Pato jergón grande.

Anas georgica spinicauda Vieillot.

Nombre local: Pato jergón.

Observado en las cuatro islas en invierno y en noviembre.

En la desembocadura del río Capitán Andresen en la isla Lennox contamos veintitrés ejemplares en una bandada posada sobre la nieve.

31.—Pato Jergón Chico.

Anas flavirostris flavirostris Vieillot.

Nombre yámana: Malápu.

Nombre local: Pato barrero.

En todos los lugares fue observado en forma similar al anterior, aun cuando en menor número.

32.—Pato Real.

Anas sibilatrix Poepping.

Nombre local: Pato real.

Observado en la laguna al poniente de Puerto Eugenia en noviembre en 1968 en número de tres ejemplares.

33.—Pato Quetru Volador.

Tachyeres patagonicus (King).

Nombre local: Quetro.

Fue observado en la margen sur del canal Beagle desde Puerto Eugenia hasta Puerto Banner en isla Picton, en parejas, durante noviembre de 1968.

34.—Pato Quetru no Volador.

Tachyeres pteneres (Förster).

Nombre yámana: Alakúsh.

Nombre local: Quetro, Pato motor.

Habitante endémico de todas las costas de las cuatro islas. Ya en parejas ya en bandaditas en las que se nota a los padres con su prole sobre todo en los primeros meses de invierno. En los islotes Eugenia sobre el canal Beagle contamos más de cuarenta ejemplares, constituyendo el grupo más numeroso que se ha observado en el área. De todas maneras, en la bandada podía distinguirse grupos entre cuatro a diez individuos, lo que correspondía sin duda a parejas con su prole.

ORDEN CICONIFORMES

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE

35.—Bandurria.

Theristicus caudatus melanopis (Gmelin).

Nombre yámana: Lakána.

Nombre local: Bandurria.

En noviembre de 1969 en los montes Miseria de isla Navarino observamos tres ejemplares que volaban emitiendo sus metálicos gritos. Los habitantes de todas las islas dan testimonio de su presencia durante fines de primavera y verano.

FAMILIA ARDEIDAE

36.—Huairavo.

Nycticorax nycticorax obscurus Bonaparte.

Nombre yámana: Pilúsh, Túwush.

Nombre local: Huairavo, Bauda.

Esta ave fue observada en todos los viajes y en todas las islas, siempre alimentándose en las orillas de las islas en aquellos lugares donde los huiros eran más abundante. En la bahía de Puerto Toro pudimos verla lejos de la orilla posada sobre los huiros buscando su comida y volando de un sitio a otro sobre las mismas plantas acuáticas.

ORDEN PELECANIFORMES

FAMILIA PHALACROCORACIDAE

37.—Cormorán Negro Austral.

Phalacrocorax olivaceus hornensis (Murphy).

Nombre yámana: Yecháj.

Nombre local: Cuervo.

Habitante endémico en las cuatro islas, observado en todos los viajes en menor cantidad que las otras especies de esta familia, aun cuando a menudo se las vio juntas. Sin embargo, como la especie más solitaria y con ejemplares más aislados, ha sido observada ésta.

38.—Cormorán de las Rocas.

Phalacrocorax magellanicus (Gmelin).

Nombre yámana: Huasáni.

Nombre local: Chaque.

Muy abundante en toda el área y en todo tiempo. En las peores condiciones climáticas se los vio volando en Oglander. Hay innumerables rocas adyacentes a las costas de todas las islas donde se les ve en grandes grupos, espulgándose o reposando en todas las horas del día. En las tardes vuelan en largas hileras hacia sus dormitorios. Uno de éstos, que a la vez es lugar de nidificación, está ubicado al suroriente del islote Snipe cerca de la punta Antimán, donde existe un acantilado de unos veinte metros de altura. Tanto viniendo de la boca oriental del Beagle a la altura de isla Nueva como del lado occidental, o sea de la isla Gable, fueron observadas estas aves en su

viaje vespertino hacia este sitio de descanso. Comparten, eso sí, el lugar con ejemplares de las otras dos especies observadas en el área.

- 39.—Cormorán imperial de las Malvinas.
Phalacrocorax albiventer albiventer (Lesson).

Nombre yámana: Huasáni.

Nombre local: Lile.

Se le encuentra en las cuatro islas e islotes adyacentes y fue observado en los tres viajes. Eso sí en menor número que el *Phalacrocorax magellanicus*.

ORDEN FALCONIFORMES

FAMILIA CATHARTIDAE

- 40.—Cóndor.

Vultur gryphus Linné.

Nombre yámana: Hueriáo.

Nombre local: Cóndor.

Pudimos observarlo sobrevolando los montes Miseria junto a paso Picton en isla Navarino. En 1968 escuchamos de boca de los habitantes de Puerto Piedra en isla Picton que en la época de esquila vieron revolotear cóndores sobre los corrales donde se efectuaba la faena. En isla Nueva hay un cerro que se llama loma Cóndor.

- 41.—Jote.

Cathartes aura jota (Molina).

Nombre yámana: Chacháj.

Nombre local: Guarro.

Fue observado en isla Nueva e isla Picton, siempre dispuesto a consumir los intestinos de las ovejas y vacunos sacrificados en los lugares de matanza junto a los pueblos. Confiadamente estaban posados en las cumbreras de los galpones y en las rocas de los cerros vecinos. En las otras islas fueron observados sobrevolando esas regiones en busca de alimento.

FAMILIA ACCIPITRIDAE

- 42.—Aguila.

Buteo fuscescens australis (Swann).

Nombre local: Aguila.

Volando desde el islote Luft hasta el cerro del Obispo, en isla Lennox, observamos una pareja en julio de 1971. Una de ellas era perseguida por un tiuque cordillerano.

Una o dos especies más de la misma familia se observaron, pero fue imposible determinarlas.

FAMILIA FALCONIDAE

- 43.—Halcón Peregrino Austral.

Falco peregrinus cassini Sharpe.

Nombre local: Halcón.

En las mismas casas de Puerto Toro observamos un ejemplar que durante un día revoloteó en el sector, posándose en los postes del pueblo.

- 44.—Cernícalo Común.

Falco sparverius cinnamominus (Swainson).

Nombre local: Cernícalo.


En Puerto Eugenia observamos una pareja en noviembre de 1968.



Vista de Puerto Toro, Isla Navarino. Foto A. B. V.



Vista río Capitán Andresen, Isla Lennox. Foto A. B. V.



Vista de Puerto Piedra (Isla Picton). Foto A. B. V.

- 45.—Tiuque de Tierra del Fuego.
Milvago chimango fuegiensis Johnson y Behm.
Nombre yámana: Yocalía.
Nombre local: Tiuque.
En todas las islas y en todo tiempo fue visto compartiendo alimentos o lugares de búsqueda con traros y jotes.
- 46.—Tiuque cordillerano del Sur.
Phalcoboenus albogularis albogularis (Gould).
Nombre local: Tiuque Negro.
En noviembre de 1968 observamos una pareja en los cerros tras Puerto Piedra en isla Picton. Persiguiendo un águila observamos un ejemplar en isla Lennox en 1971 (2).
- 47.—Traro.
Caracara plancus plancus (Miller).
Nombre yámana: Catála.
Nombres locales: Traro, Carancho.
En todas las islas durante los tres viajes fue observada esta ave generalmente en tierra firme y cerca de los lugares donde se faenaban animales de consumo casero (galpones, corrales, etc.). Nos llamó la atención la obscuridad del plumaje.

ORDEN STRIGIFORMES
FAMILIA STRIGIDAE

- 48.—Tucúquere.
Bubo virginianus magellanicus (Gmelin).
Nombre yámana: Cujúruj.
Nombre local: Buho.
Fue observado en los bosques de robles y canelos al nororiente de caleta del Oro en isla Lennox. Es interesante hacer notar el nombre onomatopéyico yámana.
- 49.—Chuncho común.
Glaucidium brasilianum nanum (King).
Nombre yámana: Lacuía.
Nombre local: Chucho.
Un ejemplar de esta ave fue observado en isla Picton en los bosques que se encuentran en caleta Paisano. Los habitantes de isla Lennox lo reconocían como habitante del lugar en caleta Brito.

ORDEN PSITTACIFORMES
FAMILIA PSITTACIDAE

- 50.—Catita Austral.
Microsittace ferruginea ferruginea (Miller).
Nombre yámana: Quina.
Nombre local: Caturra, Cata.
En noviembre observamos cinco ejemplares en Punta Gaviota al norte de Puerto Toro. En ese mismo mes escuchamos sus inequívocos gritos en isla Picton en la laguna de los Castores

(2) Se trata de la primera mención para esta especie al sur del canal Beagle.
(Nota de la Secc. Zoología).

ORDEN CORACIIFORMES
FAMILIA ALCEDINIDAE

51.—Martín Pescador.

Megaceryle torquata stellata (Meyen).

Nombre yámana: Akemakaia.

Nombre local: Martín Pescador.

En mayo y julio fueron observados ejemplares en Puerto Toro, siempre aislados. Precedido por su característico grito pudimos observarlo volando velozmente a ras del agua con muy pocos aleteos, hasta ascender repentinamente para posarse en algún tronco desnudo junto a la orilla. Desde allí observaba la posibilidad de alimento, levantando las plumas de la nuca como una cresta. En otras oportunidades, desde ese atalaya volaba como un celaje elevándose junto a la desembocadura del río Lam hasta una altura de unos ocho metros, donde permanecía aleteando en forma más fija que la que hemos observado en los bailarines en la zona central. Lo vimos con el cuerpo y cola casi verticales, las plumas de la nuca erizadas y el pico también vertical hacia el agua, para, luego de unos treinta segundos, clavarse en busca de un pescadito que engullía una vez vuelto a su atalaya. El espectáculo de las evoluciones de esta ave, sumada a la hermosura de su plumaje, constituye una maravillosa experiencia. Los vecinos de isla Lennox aseguraron que en la región norte de esa isla es bastante común.

ORDEN PICIFORMES
FAMILIA PICIDAE

52.—Carpintero Negro.

Campephilus magellanicus (King).

Nombre yámana: Lana.

Nombres locales: Gallo de Monte, Rere, Carpintero.

Observado en noviembre en los bosques al pie de los montes Miseria en isla Navarino. Un macho y dos hembras formaban un grupo que recorría los troncos de roble y canelo.

ORDEN PASSERIFORMES
FAMILIA FURNARIIDAE

53.—Churrete del Sur.

Cinclodes patagonicus chilensis (Lesson).

Nombre local: Churrete.

Fue capturado un ejemplar en julio de 1971 en Puerto Piedra, y pudimos así determinar la especie. En todas las islas se pueden observar ejemplares del género *Cinclodes*, siempre en las orillas de costa.

54.—Churrete Acanelado.

Cinclodes fuscus fuscus (Vieillot).

Nombre local: Churrete.

En el mismo lugar donde fue capturada la especie *C. patagonicus* observamos ejemplares de este *Cinclodes*, que es más pequeño y de colores más claros que el anterior.

55.—Churrete Austral.

Cinclodes antarcticus maculirostris Dabbene.

Nombre local: Churrete.

Tan abundante como el *C. patagonicus*, diferenciable por su mayor

tamaño y su coloración oscura uniforme. Ambas especies fueron observadas indistintamente en las cuatro islas en los tres viajes, aun cuando sólo en julio tuvimos especial cuidado de observarlas de muy cerca con la ayuda de binoculares.

56.—Minero Austral.

Geositta antarctica Landbeck.

En isla Lennox, entre caleta Cutter y caleta del Oro, encontramos en noviembre de 1968 muchos ejemplares, aun cuando no podríamos afirmar enfáticamente que se trata de esta especie o de *Geositta cunicularia* (Vieillot).

57.—Bandurrilla del Sur.

Upucerthia dumetaria dumetaria (Geoffroy Saint-Hilaire).

Vimos un ejemplar de esta especie al oriente de caleta Las Casas, en isla Nueva, en las márgenes del río de la Virgen, en mayo de 1970.

58.—Canastero del Sur.

Asthenes anthoides (King).

Vimos dos ejemplares en los matorrales contiguos al cementerio de caleta Las Casas, en isla Nueva, en el mes de mayo. Ese mismo mes lo observamos en los potreros al poniente de caleta Brito en isla Lennox.

59.—Rayadito Común.

Aphrastura spinicauda spinicauda (Gmelin).

Nombre yámana: Tashcúta.

Nombre local: Yiqui-Yiqui.

Ave endémica en todas las islas. Las observamos largamente en los matorrales que circundan el cementerio de caleta Las Casas en isla Nueva. En caleta Lennox, durante el mes de julio, contamos grupos de hasta 15 ejemplares en búsqueda de alimento en los bosquecillos existentes cerca de la costa, junto a los corrales de Gilberto González.

FAMILIA TYRANNIDAE

60.—Diucón Común.

Pyrope pyrope pyrope (Kittlitz).

Nombre yámana: Ushpún.

Nombres locales: Hurco, Diucón.

Todo el año en las cuatro islas. Muy común en Navarino.

61.—Dormilona de nuca castaña.

Muscisaxicola albilora Lafresnaye.

Observamos esta especie en isla Nueva en el cerro La Cruz al sur de caleta Las Casas. Tres o cuatro ejemplares cazaban insectos todavía en mayo de 1970. Es de notar que hasta esa fecha ese año fue cálido en el área. Presumiblemente emigra hacia el norte en fecha más temprana en condiciones climáticas normales.

62.—Dormilona Tontita.

Muscisaxicola macloviana mentalis Lafresnaye y D'Orbigny.

Junto a la especie anterior y en la misma fecha fue observada esta dormilona en número de alrededor de diez ejemplares. En ese mes también la observamos en los alrededores de caleta Brito, en isla Lennox, y en los alrededores de Puerto Eugenia. En noviembre de 1969 la observamos en isla Picton.

- 63.—Fío-Fío Chileno.
Elaenia albiceps chilensis Hellmayr.
Nombre local: Fío.
Vimos numerosos ejemplares durante el mes de noviembre de 1968 en los bosques que circundan a Puerto Toro.

FAMILIA ICTERIDAE

- 64.—Tordo de Tierra del Fuego.
Curaeus curaeus reynoldsi (Sclater).
Nombre yámana: Tatapúj.
Nombre local: Tordo.
Podemos afirmar que es abundante en toda el área. Lo vimos en numerosas bandadas de hasta más de diez ejemplares cerca de los poblados, disputando a veces la comida a las gallinas, gansos y patos de los vecinos.
- 65.—Loica.
Pezites militaris militaris (Linné).
Nombre yámana: Seja.
Nombre local: Lloica.
Vimos también en las cuatro islas esta especie tanto en los meses de invierno como en noviembre. En menor número que los tordos, siempre en los coironales de los potreros o en las zonas de matorrales pequeños. Hacemos notar que nos llamó la atención la coloración relativamente pálida del pecho en machos y hembras en comparación con el rojo violento que se manifiesta en la zona central. Creemos que deberá estudiarse comparativamente esto.

FAMILIA PLOCEIDAE

- 66.—Gorrión.
Passer domesticus domesticus (Linné).
Nombre local: Gorrión.
Esta avecita europea ya es habitante endémico en toda el área.

FAMILIA FRINGILLIDAE

- 67.—Fringilo Chanchito.
Phrygilus patagonicus (Lowe).
Nombre yámana: Tashúsh.
Nombre local: Quinchán.
Abundante en toda el área, fue observado en los tres viajes. Nos llamó la atención su mansedumbre en Puerto Piedra, isla Picton, donde lo observamos en bandadas de más de veinte ejemplares comiendo en los huertos del pueblo. Es frecuente en los bosques, donde escuchamos en noviembre de 1968 sus melodiosos cantos.
- 68.—Yal.
En isla Nueva observamos ejemplares de esta ave en nuestra permanencia allí durante noviembre de 1968. No pudimos determinar si se trata de *Melanodera xanthogramma* (Gray) o de *Melanodera melanodera* (Quoy y Gaimard).
- 69.—Diuca Común.
Diuca diuca diuca (Molina).
Nombre local: Diuca.

Observamos extrañados esta especie en isla Nueva en mayo y julio. La primera vez un número de hasta cuatro ejemplares durante el tiempo de nuestra permanencia en Las Casas. En julio observamos una pareja. Los vecinos de caleta Las Casas nos aseguraron de su permanencia y nidificación allí (3).

70.—Chincol Austral.

Zonotrichia capensis australis (Latham).

Nombre yámana: Chamúj.

Nombre local: Chincol.

Esta ave fue observada en noviembre de 1969 en la isla Navarino y en isla Picton en relativa abundancia.

71.—Jilguero.

Spinus barbatus (Molina).

Nombre yámana: Gashúj.

Nombre local: Jilguero.

Fue observado en los tres viajes en toda el área. En los meses de invierno los vimos en bandaditas de tres a diez ejemplares recorriendo las copas de los robles, donde se notaban plantas parásitas.

FAMILIA HIRUNDINIDAE

72.—Golondrina de Lomo Negro.

Notiochelidon cyanoleuca patagonica (Lafresnaye y D'Orbigny).

Nombre yámana: Pilushúj.

Nombre local: Golondrina.

En noviembre observamos esta especie buscando su alimento sobre los juncales de las innumerables lagunas que se encuentran en toda el área.

73.—Golondrina de Lomo Blanco.

Tachycineta leucopyga (Meyen).

Nombre yámana: Pilushúj.

Nombre local: Golondrina.

En noviembre observamos esta golondrina en compañía de la de lomo negro en las cuatro islas visitadas.

FAMILIA TROGLODYTIDAE

74.—Chercán Común.

Troglodytes aedon chilensis Lesson.

Nombre yámana: Tutu.

Nombre local: Chercán.

Lo observamos en Puerto Toro en noviembre de 1969, en los bosques al norte del puerto.

75.—Chercán de las Vegas.

Cistothorus platensis hornesis (Lesson).

Nombre local: Ratona.

Escuchamos sus cantos entre los juncales de caleta Cutter, en Lennox. En las vegas circundantes a la laguna Pidén en isla Nueva, observamos un ejemplar.

(3) En realidad esta especie está dada hasta el norte de Magallanes (JOHNSON, 1967). De todos modos la novedad está en la constatación de su presencia cinco grados geográficos más hacia el Sur. (Nota de la Sección Zoología, Depto. de Recursos Naturales).

FAMILIA TURDIDAE

76.—Zorzal Común.

Turdus falklandii magellanicus (King).

Nombre yámana: Akashish.

Nombre local: Zorzal.

Abundante en toda el área. Nos llamó la atención la nitidez de coloración en los ejemplares observados en el último viaje en el mes de julio. Igualmente es de notar su mansedumbre, debido sin duda a que los vecinos no los cazan ni los niños los persiguen.

Consideración Final

Indudablemente, en los meses de verano el área debe ser visitada por muchas especies que aquí no aparecen. Pensamos que entre ellas deben contarse diversos rapaces, patos y aves oceánicas. Nada decimos sobre churrines y otras aves que no colocamos en esta lista, aun cuando creemos haber escuchado sus gritos y cantos característicos. Otras aves deberán ser cazadas para su correcta clasificación, entre ellas pollitos de mar, chorlos, algunos petreles, becasinas, etcétera. Los habitantes de estas islas nos hablaron de diversos pingüinos y otras aves conocidas por ellos, incluso en sus lugares de nidificación, que ampliarían notablemente esta lista.

Ojalá estas modestas notas tengan algún valor para los científicos y amantes de la naturaleza de nuestro Chile.

BIBLIOGRAFIA

- BARROS VALENZUELA, RAFAEL. 1948. "Anotaciones sobre las Aves de Maullín", Revista Universitaria (Universidad Católica de Chile). Año XXXIII N° 1. Págs. 35-60.
- GOODALL, JOHNSON, PHILIPPI. 1946. "Las Aves de Chile", Platt Establecimientos Gráficos S. A. Tomos 1° y 2°.
- HUMPHREY, BRIDGE, REYNOLD, PETERSON. 1970. "Preliminary Smithsonian Manual": Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego) Smithsonian Institution, Univ. of Kansas. Museum of Natural History, Lawrence.
- MARKHAM, BRENT J. 1970. "Reconocimiento Faunístico del Area de los fiordos Toro y Cóndor e Isla Riesco, Magallanes". Anales del Instituto de la Patagonia Vol. I, N° 1. Punta Arenas, Págs. 41-59.