


Las principales variedades de Limón son Génova, Eureka y Allen.

El Chirimoyo es la cuarta especie en importancia, la superficie plantada de esta especie, alcanza a 527 ha. En la provincia de Elqui se concentra el 87,5 % de la superficie plantada, poco relevante es la superficie plantada con esta especie en las provincias Limarí y Choapa (55,6 y 10,2 ha, respectivamente). Las principales variedades son Conchalisa, Local de Serena y Bronceada.

Evolución de las Principales Especies de la IV Región



GOBIERNO DE CHILE
ODEPA

CIREN CORFO
Manuel Montt 1164
Fono: 200 89 00

CATASTRO FRUTICOLA NACIONAL

Principales Resultados

Regiones III - IV

**Actualización
1999**


Evolución de la Superficie Plantada

III REGION


En el año 1999, en la III región se registró un total de 8.405 ha plantadas con frutales, lo que significó un incremento del 23,9% respecto del Catastro anterior (1992).

La superficie plantada se distribuye en las provincias de la región, de la siguiente forma: Copiapó 6.762 ha y Huasco 1.643 ha.

Evolución de la Superficie Plantada en la III Región 1982-1999



Evolución de la Superficie Plantada en la IV Región 1982-1999



Principales Especies a Nivel Regional

III REGION


La especie de mayor superficie en la región es la Vid de Mesa con 6.427 ha, que representan el 76,5 % del total plantado en la región.

La Vid de mesa registra un incremento del 18,4%, respecto del catastro anterior. Del total plantado con Vid de Mesa, el 91,5% se localiza en la provincia de Copiapó y sólo un 8,5% en la provincia de Huasco. Las principales variedades son Thompson Seedless, Flame Seedless y Red Globe

En segundo lugar se ubica el Olivo con 1.592 ha. y un aumento de 497 ha respecto de la medición anterior. La provincia Copiapó aumentó en un 146,3 % la superficie plantada con Olivos. En la provincia de Huasco se concentra la mayor superficie plantada de Olivos en la región, alcanzando a 931 ha. Las variedades de mayor importancia son Sevillano, Araucano y Manzanillo.

El Palto se ubica en el Tercer Lugar con solo 90 ha las que se concentran en la provincia de Huasco.

Evolución de las Principales Especies de la III Región



IV REGION

En la IV región la especie de mayor importancia en cuanto a superficie plantada, es la Vid de mesa con 8.545 ha, lo que significa un aumento de 1.210 ha. respecto del catastro anterior. El 73,6% de la superficie plantada con Vid de Mesa se localiza en la provincia de Limarí y el 26,4 % en la provincia de Elqui. Las variedades de mayor superficie son Thompson Seedless, Flame Seedless y Red Globe.

En segundo lugar de importancia se ubica el Palto con 1.256 ha plantadas, las que se distribuyen en las provincias de Limarí y Choapa. Las principales variedades de Palto son Hass, Negra de la Cruz y Fuerte.

Sigue el Limonero con 838 ha, con un aumento del 38,3% en la superficie plantada. En la provincia de Elqui se registró el mayor aumento de superficie plantada con Limones, alcanzando a un 53% de incremento.

IV REGION

En el año 1992, la IV Región registraba una superficie frutícola de 10.855 ha. En 1999 la superficie plantada con frutales alcanza a 14.152 ha, lo que significa un aumento de 3.296 ha respecto de lo medido en el catastro anterior. Del total plantado en la región, el 66% se concentra en la provincia de Limarí, el 28% en la provincia de Elqui y un 6% en la provincia de Choapa.