



UPERFICIE PLANTADA A NIVEL NACIONAL

uerdo al Catastro Frutícola que lleva acabo el
o de Información de Recursos Naturales, CIREN,
la III y la X región, la superficie plantada con
es alcanza las 206.316 hectáreas. Según este
ro las principales especies a nivel nacional son
mesa, manzano rojo, palto, ciruelo japonés,
, duraznero tipo conservero y nectarino.



Fecha de actualización Catastro Frutícola

III y IV región año 1999
 V región año 2002
 Región Metropolitana año 1997
 VI región año 2003
 VII región año 2001
 VIII, IX y X año 2000



Manuel Montt 1164

Providencia • Santiago • Chile

Fonos: 56-2 200 8990 - 200 8900

Fax: 56-2 200 8914

ciren@ciren.cl • www.ciren.cl




GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CATASTRO FRUTICOLA NACIONAL


Principales Especies

Area Fruticola - CIREN - 2004





VID DE MESA

La vid de mesa aparece en primer lugar con la mayor superficie plantada a nivel nacional y un total de 47.727 ha. Las plantaciones se encuentran en la III región, 6.427 ha.; en la IV región con 8.545 ha., en la V región con 10.375 ha., en la Región Metropolitana que tiene 9.251 ha., en la VI región con 12.671 ha. y en la VII región con sólo 414 ha. Las variedades más plantadas son Thompson Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Crispin Seedless y Superior Seedless.




MANZANO ROJO

En nuestro país existen 28.383 ha. plantadas con manzano rojo. De éstas, el 64% se localiza en la VII región con 18.172 ha. La VI región presenta 6.810 ha., la VIII región 1.212 ha., la IX región 1.152 ha., la Región Metropolitana 608 ha., la X región 308 ha. y la V región 111 ha. Las variedades más importantes respecto a superficie son Royal Gala, Red Chief, Fuji, Scarlett y Red King Oregon.



PALTO

El palto muestra una superficie plantada de 21.983 ha. Esta especie se localiza principalmente en la V región, donde se registran 14.930 ha. En la Región Metropolitana la superficie plantada con esta especie es de 3.672 ha., en la VI región alcanza las 2.007 ha. y en la IV región existen 1.256 ha. Las variedades más importantes son Hass, Fuerte, Negra de la Cruz y Bacon.




CIRUELO JAPONES

El ciruelo japonés aparece en el cuarto lugar respecto a la superficie plantada, llegando a 8.289 ha. La VI región es la más importante con 3.946 ha., sigue la Región Metropolitana con 2.669 ha. y la VII región con 1.066 ha. Las principales variedades son Larry anne, Angeleno, Blackamber y Fortune.



NO

El nogal ocupa una superficie de 7.727 ha. a nivel nacional. De ésta, el 45,5% se localiza en la Región Metropolitana, en el mismo porcentaje aparece la V región con 2.220 ha., luego la VI región con una superficie de 1.372 ha., la VII región con un registro de 119 ha. y la VIII región con 37 ha. Las principales variedades son Serr, California, European y Payne's Seedling.



DURAZNERO TIPO CONSERVERO

Existen en el país 7.448 ha. plantadas con duraznero tipo conservero que se concentran en las regiones V, Metropolitana y VII, con superficies de 2.540 ha., 1.332 ha. y 3.384 ha. respectivamente. La IV región presenta una superficie de 31 ha. y la VII región 159 ha. Las principales variedades son Doctor Davis, Andross, Loadel, Carson y Phillip's.

