

Fecha de Actualización
Catastro Frutícola

III y IV región, año 1999

V región año 2002

Metropolitana, año 1997

VI año 1995

VII región año 2000

VIII, IX y X año 2000

Preparado por área Frutícola
Ciren

CÍTRICOS

Manuel Montt 1164

Santiago de Chile

Fonos (56-2) 200 8990 • 200 8900

Fax (56-2) 200 8914


e-mail: ciren@ciren.cl

www.ciren.cl






La superficie frutal plantada en el país alcanza a 197.547 hectáreas, de las cuales 16.182 ha corresponden a plantaciones de cítricos.



LIMONEROS

Los Limoneros alcanzan en el país una superficie de 7.092,9 ha. que se distribuyen de la siguiente forma: 89,7 ha. en la III región, 837,6 ha. en la IV región, 1.854,1 ha. en la V región, 2.925,6 ha. en la región metropolitana, 1.303,6 ha., en la VI región, 73,2 ha. en la VII y 9,2 en la VIII.


Las variedades más importantes en cuanto a superficie son Genova, Eureka y Fino 49.



NARANJOS

Existen en el país 7.068,7 ha. plantadas de naranjos de las cuales el 97,2 % se concentra en las regiones VI, Metropolitana y V, con 3.716,1, 1.713,8 y 1.450,3 ha. respectivamente. La III región registra una superficie de 42,2 ha. de naranjos y la IV región 124,6 ha. En la VII región la superficie es de 20 ha y en la VIII región 1,8 ha.


Las variedades de mayor superficie en el país son Thompson, Tardía de Valencia y Washington Navel.



MANDARINOS

En la especie Mandarinos, la región más importante en cuanto a superficie es la IV región con 763,2 ha. Le sigue la V región con 483,5 ha. y la región metropolitana que registra una superficie de 264,5. Estas regiones concentran el 89,4% de la superficie plantada con esta especie.

Las variedades de mayor superficie a nivel nacional son: Clemenuless y Fortune.




LIMA, POMELO y TANGELO

Lima, esta especie registra en el país 45 ha. de las cuales, el 52,9 % se localiza en la IV región (23,8 ha.) y el 24,9% se concentra en la región Metropolitana, correspondiendo a 11,2 ha. La variedad con mayor superficie es la Lima bears.

Pomelo, alcanza una superficie de 249,6 ha., siendo la V región la que registra la mayor superficie (130,9 ha.), le sigue la VI región con 66,3 ha y la región metropolitana con 45,6 ha. La variedad de mayor superficie es Star Ruby.

Tangelo, a nivel nacional esta especie alcanza a 36,7 ha., concentrándose la mayor superficie en la VI región.



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE POR METODO DE RIEGO

El método de riego tradicional más usado en plantaciones de cítricos corresponde al riego por surco (53,6%).

El 42,8 % de la superficie plantada con cítricos utiliza riego tecnificado (goteo 39,5%, Microaspersión 3% y Aspersión 0,3%).

