The left side of the cover features a close-up photograph of a bunch of green grapes, filling the background with their textured, round forms.

Fecha de Actualización  
Catastro Frutícola

III y IV región, año 1999

V región año 2002

Metropolitana, año 1997

VI año 1995


VII región año 2001

VIII, IX y X año 2000

Preparado por área Frutícola  
Ciren

A blue rounded rectangular box containing contact information for CIREN.

Manuel Montt 1164  
Santiago de Chile  
Fonos [56-2] 200 8990 • 200 8900  
Fax [56-2] 200 8914  
e-mail: [ciren@ciren.cl](mailto:ciren@ciren.cl)  
[www.ciren.cl](http://www.ciren.cl)


The right side of the cover features a close-up photograph of a bunch of mixed grapes, including green, dark purple, and red varieties, set against a dark background.

UVA  
DE  
MESA

# PRINCIPALES VARIEDADES A NIVEL REGIONAL



## III Región

En la III región la variedad más importante es Thompson Seedless con 2.156 ha., seguida de Flame Seedless con 1.614 ha., Redglobe con 1.162 ha., Superior Seedless con 639 ha. La variedad Thompson ocupa el 34% de la superficie plantada con uva de mesa de la III región.




## IV Región

Thompson Seedless con 2.764 ha. es la variedad de mayor importancia en la IV región, ocupa el 32% de la superficie plantada con uva de mesa. Sigue en orden de importancia la variedad Flame Seedless que registra 2.169 ha., Redglobe con 2.094 ha. y Superior Seedless con 494 ha.



## V Región

La variedad Flame Seedless registra la mayor superficie, con 2.531 ha., lo que significa en términos porcentuales un 25% del total plantado de uva de mesa en la región. Sigue Thompson Seedless con 2.384 ha., Redglobe con 1.810 ha. y Crimpson Seedless con 1.189 ha.




## Región Metropolitana

La principal variedad de la región Metropolitana es Thompson Seedless con 4.349 ha., que representan el 47% de la superficie plantada con uva de mesa. La variedad Flame Seedless registra una superficie de 1.239 ha. y Red Globe 1.196 ha. La variedad Ribier ocupa una superficie de 1.018 ha. y el resto de las variedades en conjunto, representan el 16% de la superficie plantada con la especie.


## VI Región

En esta región, la principal variedad de uva de mesa es Thompson Seedless con 4.663 ha., seguida de la variedad Ribier con 1.470 ha., Flame Seedless (1.323 ha.) y Redglobe (968 ha.). El resto de las variedades en conjunto alcanzan a 1.462 ha.




## VII Región

La VII región registra una superficie de 449 ha. plantadas de uva de mesa, de las cuales 149 corresponden a la variedad Flame Seedless, 87 ha. a la variedad Thompson Seedless, 66 ha. a Redglobe y a la variedad Ribier 62 ha. El resto de las variedades concentran el 19% de la superficie de uva de mesa de la región.



## SUPERFICIE PLANTADA DE UVA DE MESA A NIVEL NACIONAL

Según las últimas actualizaciones de Catastro Frutícola, existen en el país 44.940 ha. plantadas con uva de mesa, que se distribuyen en las regiones de la siguiente forma: 10.380 ha. en la V región, 9.886 ha. en la VI región, 9.251 ha. en la región Metropolitana, 8.545 ha. en la IV región, 6.427 ha. en la III región y 449 ha. en la VII región.



## PRINCIPALES VARIETADES A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional la variedad de mayor superficie es Thompson Seedless, que registra 16.402 ha., le sigue en orden de importancia Flame Seedless con 9.027 ha., Red globe con 7.297 ha., Ribier con 3.291 ha., Superior Seedless con 2.038 ha., Crimpson Seedless con 1.347 ha., Ruby Seedless con 1.212 ha. y Red Seedless 1.025 ha.

