

Aves 4: Perdicitita cojón, Gaviota andina, Caití



macho



hembra

Nombre Vulgar/Científico	Perdicitita cojón (<i>Thinocorus orbignyianus</i>)
Descripción	Mide 22 cm de largo.
Hábitat	Habita la zona andina desde Arica-Parinacota hasta Tierra del Fuego, habitando zonas bajas en las regiones australes.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada.
Alimentación	Se alimenta de semillas e invertebrados.
Observado en	Salar de Alconcha, Amincha, Chaihuiri, Salar de Ascotán, Turi, Putana, Machuca, Salar de Tara, Salar de Aguas Calientes 3, Salar de Pujsa, Laguna Lejía, Sucultur, Tapur, Salar de Talar y Laguna Tuyajto.

Consultor : Juan Carlos Torres Mura

Proyecto INNOVA CHILE - CIREN: “Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta”



Nombre Vulgar/Científico	Gaviota andina (<i>Larus serranus</i>)
Descripción	Mide 45 cm de largo.
Hábitat	Habita en humedales andinos desde Arica-Parinacota hasta Aysén; en invierno algunas bajas hasta la costa.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada.
Alimentación	Se alimenta de invertebrados acuáticos y de carroña.
Observado en	Salar de Ascotán, Putana, Machuca, Salar de Tara, Salar de Pujsa, Laguna Lejía, Salar de Talar y Laguna Tuyajto.

FICHA TÉCNICA RESULTADO CAMPAÑA DE TERRENO/Oct.2009



Nombre Vulgar/Científico	Caití (<i>Recurvirostra andina</i>)
Descripción	Mide 45 cm de largo.
Hábitat	Habita en salares y lagunas andinas desde Arica-Parinacota hasta Atacama.
Vulnerabilidad	Especie nativa no amenazada.
Alimentación	Se alimenta de invertebrados acuáticos
Observado en	Salar de Ascotán, Salar de Tara, Salar de Aguas Calientes 3, Salar de Talar y Laguna Tuyajto.